

¿Cuándo debería quedarme en casa?

TENGO FIEBRE	TENGO VÓMITOS	TENGO DIARREA	TENGO SARPULLIDO	TENGO TOS O DIFICULTAD PARA RESPIRAR	TENGO INFECCION EN LOS OJOS	ESTUVE HOSPITALIZADO	PERDÍ EL GUSTO O EL OLFATO
							
Temperatura de más de 100° F	En las últimas 24 horas	En las últimas 24 horas	Sarpullido en el cuerpo con supuración, secreción o fiebre	NO retrase el tratamiento médico si tiene dificultad para respirar	Enrojecimiento, picazón o secreción de pus del ojo	Estancia en el hospital o visita en la sala de emergencias	En las últimas 24 horas

Estoy listo para volver a la escuela cuando...

No tenga fiebre sin la ayuda de medicamentos (es decir, Tylenol, Motrin, Advil) por 24 horas.	No tenga vómitos por 24 horas.	No tenga diarrea por 24 horas.	No tenga sarpullido ni fiebre y mi proveedor médico me haya examinado, si era necesario.	Mi proveedor médico me haya examinado, si era necesario.	No tenga secreción o mi proveedor médico me haya examinado, si era necesario.	Reciba la autorización de mi proveedor médico para hacerlo.	Considere la prueba del COVID. Consulte con su proveedor médico antes de volver a la escuela.
---	--------------------------------	--------------------------------	--	--	---	---	---

Si su hijo tiene faringitis estreptocócica u otra infección bacteriana, debe quedarse en casa hasta que haya tomado el antibiótico por al menos 24 horas y su proveedor de atención médica lo haya dejado volver a la escuela. Lo animamos a que pida atención médica cuando su hijo esté enfermo y a que siga las recomendaciones de su proveedor de atención médica para volver a la escuela y hacer otras actividades.